

GUIDE POUR LES ACCOMPAGNATEURS

DE: _____

PARENTS :

TÉL. :

MÉDECIN :

TÉL. :

MERCI DE TOUJOURS INFORMER IMMÉDIATEMENT LES PARENTS DANS LES CAS SUIVANTS :

- Coups ou impacts dans les zones suivantes : tête, yeux, cou et nuque, poitrine, ventre, hanche
- Fractures
- Saignements articulaires ou musculaires
- Les lacérations, telles que les abrasions ou les coupures superficielles qui saignent encore après 20 minutes

VOICI COMMENT RECONNAÎTRE LES SAIGNEMENTS ARTICULAIRES ET MUSCULAIRES :

- Restrictions et douleurs lors des déplacements
- Rigidité
- Douleurs articulaires
- Gonflements de l'articulation ou du muscle
- Réchauffement de la peau sur l'articulation ou le muscle
- Effet de « bouillonnement » ou « picotement » dans l'articulation ou le muscle
- Sensation de chaleur dans l'articulation ou le muscle
- Changement de couleur de la peau au niveau de l'articulation ou du muscle

MERCI DE TOUJOURS TENIR COMPTE DE CES INFORMATIONS :

- **Ne pas** donner d'acide **acétylsalicylique/AAS** à l'enfant !
- Toujours **utiliser** des moyens aussi **stérilisés** que possible lorsque vous intervenez sur des plaies ouvertes (mains ou gants lavés, désinfecter les plaies ou les bords des plaies)



Que s'est-il passé ?	Quelle action immédiate ?	Parents	Médecin
Ecchymoses	Refroidir ou appliquer un coussin réfrigérant	☐	☐
Saignement de la langue ou de la bouche	Sucer une glace ou une crème glacée	☐	☐
Saignements de nez	Mettre un tissu froid dans le cou, pencher la tête vers l'avant et pincer les narines pendant 10 minutes	☐	☐
Abrasions et coupures	Nettoyer et désinfecter (par exemple avec du Betaisadonna)	☐	☐
Saignements articulaires ou musculaires	Si possible, surélever la partie affectée du corps Mettez un coussin réfrigérant ou un tissu rempli de glace sur la plaie	☐	☐

Vous trouverez d'autres formulaires utiles à l'adresse suivante : myhaemophilie.ch

Un service fourni par Takeda Pharma AG, 8152 Opfikon